

## GRANDES CULTURES

Envoi n° 28 du 17 octobre 1995

ISSN N° 0767 - 5542

### Colza

Stades : 5 à 7 feuilles en général

### Altises

Poursuite du vol.

### Charançon du bourgeon

Le vol est en cours dans de nombreux secteurs.

### Pucerons



Infestations toujours très variables d'une parcelle à une autre.

Une intervention insecticide cette semaine, si maintien de conditions douces, permettra de lutter contre les charançons, les pucerons et les altises encore présentes.

Toutefois parmi toutes les cicadelles qui volent dans les parcelles, seules quelques unes sont des *Psammotettix* responsables de la transmission du virus des pieds chétifs. La grande majorité des cicadelles ne sont pas nuisibles. Elles constituent toutefois un indicateur des conditions favorables à ce type d'insecte.

Pour piéger les cicadelles, il faut utiliser des cuvettes jaunes ou des pièges englués à fonds jaunes. L'observation à l'oeil est délicate mais possible.

Description de *Psammotettix* sp :  
(taille réelle 3.6 à 4.4 mm)



**Colza :**  
traitement  
charançon

**Céréales**  
traitement  
cicadelles

**Campagnols**  
à surveiller

### Céréales

Stades :

- orges : 1ère à 3ème feuille pointante
- blés : semis à 1 feuille

### Limaces

Attention les limaces sont toujours très actives. Surveillez vos parcelles et intervenez si nécessaire.

### Cicadelles

Les conditions ensoleillées de la semaine dernière ont favorisé l'activité des cicadelles dans toute la région.

### Pucerons

Quelques pucerons ont commencé à s'installer en parcelles la semaine dernière. Les taux de colonisation sont de l'ordre de 5 à 10 % de pieds touchés. On trouve également des pucerons dans les repousses et sur des maïs non encore récoltés.

Le vol à la tour à succion a également augmenté la semaine dernière, tout en restant inférieur à la même période de l'année 94 .

Les analyses réalisées la semaine dernière sur des repousses prises au hasard, montrent la présence très fréquente de JNO . Secteurs concernés : Melun, Donnemarie, Voulton, La Ferté Gaucher, Coulommiers, Crécy la chapelle, Limours.....D'autres analyses sont en cours . Il y a un certain réservoir de virus . Le virus des pieds chétifs n'a été détecté qu'à Chailly en brie .

**Si les conditions restent douces comme cela est prévu, le risque virose va augmenter . Il convient d'assurer une protection contre les cicadelles sur les parcelles au stade 1 à 3 feuilles, non traitées GAUCHO, dans le courant de la semaine. Ce traitement visera également les premiers pucerons .**

## Campagnols

Des dégâts importants sont signalés sur plusieurs secteurs : Sonchamp, Rambouillet, Maisse.....Des mesures urgentes doivent être prises pour protéger la levée des céréales :

- sur les parcelles déjà semées, intervenez rapidement sur toute la parcelle dès l'apparition de dégâts
- sur les parcelles non encore labourée, le labour va faire fuir les campagnols . Ensuite un traitement de bordure de la parcelle devrait limiter leur retour .

Produit autorisé : chlorophacinone, sous forme d'appâts de blé entier enrobé .

Les traitements sont à réaliser en lignes continues et parallèles, espacées de 5 mètres, à la dose de 12-15 kg/ha .

Proscrire :

- l'épandage à la volée, inefficace
- les tas, dangereux pour d'autres espèces
- les surdosages, inutiles et dangereux .